

1. Mitä LAXOGAS® ja mihin sitä käytetään

LAXOGAS® on lääkinällinen valmiste, joka helpottaa nopeasti liiallisen kaasun aiheuttamia ruuansulatuskanavan ongelmia. LAXOGAS®-valmisteen pääainesosa on vaahtoamisenestoaine simetikoni, joka hajottaa vatsaan ja suolistoon kertynyttä kaasua.

LAXOGAS®-valmistetta käytetään:

- ruuansulatuskanavan liiallisen kaasunmuodostuksen lievitykseen
- ruuansulatuskanavan epämukavien tuntemusten kuten ilmavaivojen, röyhtäilyn, liiallisen suolikaasun, vatsan turpoamisen tai vatsan täysinäisyyden tunteen helpottamiseen ja oireenmukaiseen hoitoon

2. Ennen kuin käytät LAXOGAS®-valmistetta

Älä käytä LAXOGAS®-valmistetta, jos olet allerginen (yliherkkä) simetikonille tai jollekin muulle LAXOGAS®-valmisteen aineelle.

Tämä valmiste sisältää sorbitolia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, ei pidä käyttää tätä lääkinällistä laitetta.

Tämä valmiste sisältää piparminttuaromia. Sisäänhengittäminen voi aiheuttaa hengenahdistusta tai astmakohtauksen.

Ota aina yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on pitkäaikaisia ja selittämättömiä vatsavaivoja.

Raskaus ja imetys

LAXOGAS®-valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana, sillä se kulkee vatsan läpi muuttumattomana eikä imeydy elimistöön. On kuitenkin suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen LAXOGAS®-valmisteen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Käyttö lapsille ja diabeetikoille

Ei saa käyttää alle 6-vuotiaille lapsille.

LAXOGAS®-valmiste soveltuu diabeetikoille. Rakeet eivät sisällä sokeria. Yksi annospussi sisältää 1 g helposti sulavia hiilihydraatteja.

3. Miten LAXOGAS®-valmistetta käytetään

Käytä LAXOGAS®-valmistetta juuri siten kuin tässä selosteessa on kuvattu.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

- LAXOGAS®-valmiste otetaan aterioiden yhteydessä tai niiden jälkeen ja tarpeen mukaan ennen nukkumaan menoa.
- LAXOGAS®-valmiste voidaan ottaa ilman vettä. Laita rakeet kielellesi. Rakeet liukenevat suussa ja ne niellään syljen mukana. Voit halutessasi juoda vettä valmisteen ottamisen jälkeen.
- LAXOGAS®-valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön eikä sitä pidä käyttää yli 30 päivää keskustelematta lääkärin kanssa.

Suositteltu annos (ellei lääkäri määrää toisin):

Ikä	Yksittäinen annos	Kokonaisvuorokausiannos
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat nuoret	1–2 annospussia	6 annospussia
6–14-vuotiaat lapset	1 annospussi	3 annospussia

Jos otat suositeltua annosta enemmän tai jos unohdat ottaa LAXOGAS®-valmistetta
Simetikonin vaikutus ruuansulatuskanavassa on puhtaasti fyysikaalinen. Suositeltuja annoksia suuremmat simetikonimäärät siedetään usein ongelmitta. Älä ota kaksinkertaista LAXOGAS®-annosta, jos olet unohtanut ottaa edellisen annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset ja käyttö muiden valmisteiden kanssa

LAXOGAS®-valmisteen aiheuttamia haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia muiden valmisteiden kanssa ei toistaiseksi tunneta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. LAXOGAS®-valmisteen säilyttäminen

Pidä lääkinnälliset laitteet poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä LAXOGAS®-valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. Muuta tietoa

LAXOGAS®-valmistetta on saatavilla 18 annospussin pakkauksissa.
Yksi annospussi sisältää 125 mg simetikonina.
Muut aineet:
Sorbitoli, piidioksidi, natriumkarboksimeetyyliselluloosa ja piparminttuaromi.



Valmistaja:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck – Saksa

Jakelija:

Sanofi Oy
Revontulenkujja 1
02100 Espoo

Selosteen päivämäärä: 15.8.2017

1. Vad LAXOGAS[®] är och vad det används för

LAXOGAS[®] är en medicinteknisk produkt som bidrar till snabb lindring av mag-tarmbesvär som orsakas av överskott av gas. LAXOGAS[®] består huvudsakligen av simetikon, ett gashämmande medel som bryter ner gas som samlats i mage och tarm.

LAXOGAS[®] används:

- för att lindra väderspänningar (gasbesvär) i mag-tarmkanalen
- för lindring och symtomatisk behandling av obehag från mage och tarm såsom gasbildning, rapningar, gaser i magen, uppkördhet, uppsvälld buk och för tidig mättnadskänsla

2. Vad du behöver veta innan du använder LAXOGAS[®]

Använd inte LAXOGAS[®] om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller någon av de andra ingredienserna i LAXOGAS[®].

Denna produkt innehåller sorbitol. Personer med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte använda denna medicintekniska produkt.

Denna produkt innehåller pepparmintarom. Inhalation kan leda till andnöd eller astmaanfall.

Berätta alltid för din läkare om du har långvariga eller oförklarliga magproblem.

Graviditet och amning

LAXOGAS[®] kan tas under graviditet och amning eftersom det passerar oförändrat genom mage och tarm och inte tas upp i kroppen. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådfråga din läkare innan du använder LAXOGAS[®].

Användning hos barn och diabetiker

Denna produkt ska inte användas av barn under 6 års ålder. LAXOGAS[®] är lämpligt för diabetiker. Granulaten (kornen) innehåller inte socker. Varje dospåse innehåller 1g nedbrytbara kolhydrater.

3. Hur du använder LAXOGAS[®]

Ta alltid LAXOGAS[®] enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- LAXOGAS[®] ska tas i samband med måltid eller efter måltid, och vid behov före läggdags.
- LAXOGAS[®] kan tas utan vatten. Lägg granulaten (kornen) på tungan. Granulaten löses upp av saliven och kan sedan sväljas ner. Om du vill kan du dricka vatten efteråt.
- LAXOGAS[®] är en produkt som är avsedd för kortvarig användning och bör inte tas längre än 30 dagar utan att rådfråga läkare.

Rekommenderad dos (om inte läkare föreskrivit annat):

Ålder	Engångsdos	Total dagsdos
Vuxna och ungdomar från 14 år	1-2 dospåsar	6 dospåsar
Barn mellan 6-14 år	1 dospåse	3 dospåsar

Om du tagit mer än rekommenderat eller om du glömt bort att ta LAXOGAS[®]

Simetikon har enbart fysikalisk effekt i mag-tarmkanalen. Om du tar större mängder än vad som är rekommenderat, brukar detta vanligtvis tolereras utan större besvär. Ta inte dubbel dos av LAXOGAS[®] för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar och samtidigt intag av andra produkter

Inga biverkningar eller interaktioner med andra produkter är kända med LAXOGAS[®]. Om du märker någon biverkan ska du informera din läkare eller apotekspersonal.

5. Hur LAXOGAS® ska förvaras

Förvara medicintekniska produkter utom räckhåll för barn.
Använd inte LAXOGAS® efter att hållbarhetstiden passerats.

6. Övrig information

LAXOGAS® finns tillgänglig i förpackningar med 18 dospåsar.
Varje dospåse innehåller 125 mg simetikon.

Övriga innehållsämnen:

Sorbitol, kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa och pepparmintarom.



Tillverkare:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck - Tyskland

Distributör:

Sanofi Oy
Norrskensgränden 1
02100 Esbo

Datum för information: 15.8.2017